

Ballondilatatie (PTA)

Vernauwing van een bekken- of beenslagader



Uw arts

Dr. Evelyne Spriet

Vaat- en thoraxchirurg

In één oogopslag

Verdoving

Lokaal, via een prik in de lies

Verblijf

Meestal één nacht

Herstel

Vijf dagen geen zwaar
werk

Bewaar deze brochure. Op de laatste pagina staan uw persoonlijke afspraken: datum, uren en medicatie.



Meer online

Uw traject

Zo verloopt uw behandeling, van de raadpleging tot de controle.



Mevrouw, mijnheer

U krijgt deze brochure omdat we samen een behandeling besproken hebben. Lees ze rustig na, samen met uw familie als u dat wil. Hebt u nog vragen, stel ze gerust. Deze brochure is een algemene leidraad; uw behandeling kan in de praktijk anders verlopen.

1. De ingreep begrijpen

De aandoening
De ingreep
Risico's

2. Voorbereiding en opname

Checklist
Opname en verloop

3. Thuis

Thuis
Wanneer belt u?

4. Mijn afspraken

Datum, uren en medicatie
Contact

1 De ingreep begrijpen

De aandoening

Het hart pompt bloed via de slagaders naar alle organen en lichaamsdelen. Door aderverkalking kan een bekken- of beenslagader vernauwen of verstopen. Het been krijgt dan te weinig bloed.


De typische klacht is pijn bij het stappen die verdwijnt als u stilstaat (etalagebenen of claudicatio). Later kunnen rustpijn, nachtelijke pijn, koude of verkleurde voeten en slecht genezende wonden optreden. Risicofactoren zijn roken, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes en erfelijkheid.

We onderzoeken de polsslag in lies, knieholte en voet, doen een duplexonderzoek op de raadpleging en zo nodig een CT- of MR-angiografie.

De ingreep

Bij een percutane transluminale angioplastie (PTA) rekken we het bloedvat van binnenuit open. Dit is waar mogelijk de voorkeursbehandeling: doeltreffend, weinig ingrijpend en zo nodig later te herhalen.

1. We prikken de liesslagader (soms de armslagader) aan en plaatsen een dun buisje (sheath).
2. Met contraststof maken we foto's van de vernauwing.
3. Een ballon op een voerdraad rekt de vernauwing open. Is het resultaat onvoldoende, dan plaatsen we een stent.
4. De prikplaats wordt dichtgedrukt of gesloten en krijgt een drukverband.



Bij een ballondilatatie (PTA) wordt de vernauwing van binnenuit opengerekt.

Risico's

Bij elke operatie bestaat een klein risico op wondinfectie, trombose, longembolie, longontsteking of hartproblemen. Daarom gebeuren vooraf de nodige onderzoeken.

Een dilatatie is een veilige ingreep. Zelden treedt een bloeduitstorting rond de prikplaats op, een vals aneurysma (plaatselijke verwijding) of schade aan het bloedvat. Heel zelden ontstaat een stolsel dat het bloedvat afsluit. De contraststof kan een allergische reactie geven of de nieren belasten.

2 Voorbereiding en opname

Checklist: vink af wat in orde is

- ☐ Ik volg de afspraken over mijn medicatie, vooral over bloedverdunners.
- ☐ Vanaf middernacht eet en drink ik niets meer, behalve de afgesproken medicatie met een slokje water.
- ☐ Ik neem mijn identiteitskaart mee.
- ☐ Ik neem de gegevens van mijn hospitalisatieverzekering mee.
- ☐ Ik neem mijn medicatielijst mee.
- ☐ Ik neem toiletgerief en gemakkelijke kledij mee voor enkele dagen.

Opname en verloop

Het tijdstip van opname en de afspraken over uw medicatie bespreken we op de raadpleging. Op de dag van de ingreep bent u nuchter: vanaf middernacht niet meer eten of drinken, behalve de afgesproken medicatie met een slokje water.

U meldt zich aan bij de inschrijvingen van AZ Alma Eeklo (door de draaideur, naar rechts) met uw identiteitskaart en, als u die hebt, de gegevens van uw hospitalisatieverzekering. Daarna gaat u naar de afdeling.

Na de ingreep gaat u via de ontwaakzaal terug naar uw kamer. Het drukverband in de lies blijft tot de volgende dag. Dan verwijdt de arts het, controleert de lies en bespreekt uw medicatie. Daarna mag u naar huis.

Thuis

- Wandelen mag meteen. De eerste vijf dagen doet u geen zwaar werk.
- Blauwe verkleuring rond de prikplaats en het bovenbeen is de eerste dagen normaal.
- Het waterdichte verband laat douchen toe. Laat het ongeveer vijf dagen zitten; daarna mag het eraf.
- Neem uw bloedverdunners stipt in.

Wanneer belt u?

- Plotse zwelling of toenemende pijn aan de prikplaats
- Een koud, bleek of pijnlijk been
- Koorts of roodheid aan de prikplaats

Secretariaat 09 310 04 47. Buiten de kantooruren: spoedgevallen AZ Alma 09 310 00 00.
Levensbedreigend: 112.

4 Mijn afspraken

Datum ingreep

Aanmelden om

Nuchter vanaf

Medicatie

Controleafspraak

Notities

Uw arts kan deze velden op de raadpleging digitaal invullen, of u vult ze zelf in op papier.

Contact

Secretariaat heerkunde 09 310 04 47

Algemeen nummer AZ Alma 09 310 10 50

E-mail secr.chirurgie@azalma.be

Adres AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Website www.drspriet.be/etalagebenen.html

© 2026 Dr. Evelyne Spriet · Versie september 2026 · Medisch nagelezen door Dr. Evelyne Spriet.

Deze brochure is een algemene leidraad en vervangt geen persoonlijk medisch advies. Afdrukken en delen voor persoonlijk gebruik is toegestaan; andere overname enkel met schriftelijke toestemming.